

**Ca. SPINOCELLULARE DELL' ESOFAGO:
ALGORITMO PER STADI I-III (malattia loco-regionale)**

**T
N
M**

Tumore primitivo (T)

Tis= carcinoma in situ/displasia di alto grado (HGD)

T1a,b= tumore invade la mucosa o la lamina propria o la muscolaris mucosae (a) o sottomucosa (b)

T2= tumore invade la muscolare propria

T3= tumore invade l'avventizia

T4a= tumore invade pleura, pericardio o diaframma

T4b= tumore invade aorta, corpi vertebrali o trachea

Linfonodi regionali (N) I linfonodi regionali, indipendentemente dalla sede del tumore primitivo, sono quelli inclusi nell'area di drenaggio linfatico dell'esofageo comprendente i linfonodi dell'asse celiaco e i linfonodi paraesofagei del collo, ma non i linfonodi sovra clavicolari

N0 non evidenza di metastasi ai linfonodi regionali

N1 metastasi in 1 o 2 linfonodi regionali


N2 metastasi in 3-6 linfonodi regionali

N3 metastasi in ≥ 7 linfonodi regionali

Metastasi a distanza (M)


M0 non evidenza di metastasi a distanza

M1 metastasi a distanza




Nel caso il paziente sia giudicato non candidabile alla chirurgia, è possibile ricorrere a resezioni endoscopiche per i T1b N0 o, in stadi più avanzati CT/RT o, qualora inapplicabili modalità combinate, solo CT, o RT o BSC

ADENOCARCINOMA DELL' ESOFAGO: ALGORITMO PER STADI I-III (malattia loco-regionale)



CARCINOMA ESOFAGEO: ALGORITMO TERAPEUTICO DELLA MALATTIA IN IV STADIO



I LINEA:

**Regimi a 2 farmaci sono da preferire; i regimi a 3 farmaci sono proponibili solo a pz in ottime condizioni generali.
La capecitabina può sostituire il 5-Fluorouracile e l'oxaliplatino il cisplatino.**

In caso di iperespressione di HER2, solo ed esclusivamente per l'adenocarcinoma GGE, alle fluoropirimidine e Cisplatino può essere aggiunto Trastuzumab (Herceptin)*.

Schemi a 3 farmaci:

- DCF (Docetaxel, Cisplatino e 5-FU) e mDCF (Docetaxel, 5 FU, Oxaliplatino/Carboplatino)
- ECF (Epirubicina, Cisplatino, 5-FU) oppure EOX
- Fluoropirimidine, Cisplatino + Trastuzumab*
- COI (Capecitabina, Oxaliplatino, Irinotecan)

Schemi a 2 farmaci:

- Fluoropirimidine-Cisplatino
- Fluoropirimidine-Oxaliplatino
- Docetaxel-Cisplatino
- Cisplatino o Carboplatino – Paclitaxel
- Cisplatino-Vinorelbina o Irinotecan
- Fluoropirimidine-Irinotecan

II LINEA (a seconda dello schema impiegato in I linea e del PS del pz):

- Ramucirumab* +/- *Paclitaxel* (solo per adenocarcinoma della GGE dopo precedente chemioterapia con platino e fluoro pirimidine)
- Paclitaxel
- Irinotecan
- Docetaxel