MELANOMA (A.Marte 04/2018)

Recidiva come metastasi in transit o satellitosi:

- Indicata resezione chirurgica con margini liberi;
- Nel caso di exeresi di metastasi in transit è indicato eseguire la biopsia del linfonodo sentinella;
- Nel caso di impossibilità ad eseguire exeresi radicale o di plurime riprese loco-regionali a livello dell'arto è indicata riunione multidisciplinare per valutare trattamenti locoregionali (perfusione in ipertermia con Melphalan e TNF α , elettrochemioterapia).

Terapia sistemica per Melanoma in stadio IIIc o IV non operabile:

- Immunoterapia:
 - Pembrolizumab;
 - Nivolumab;
 - Nivolumab + Ipilimumab (non rimborsabile in associazione);
- Ipilimumab (dalla seconda linea);
- Monochemioterapia con Dacarbazina, Temozolamide o Fotoemustina (dalla seconda linea o se controindicata l'immunoterapia);
- In pazienti con mutazione di BRAF V600: indicato trattamento con BRAF inibitore + MEK inibitore:
 - Dabrafenib/trametinib*
 - Vemurafenib/Cobimetinib*.
- In pazienti con mutazione NRAS:
 - Binimetinib*.
- Clinical trial.

*Non rimborsabile in Italia.

Bibliografia:

- Linee Guida AIOM;
- NCCN Guidelines Version 1.2017