CARCINOMA POLMONARE A PICCOLE CELLULE (SCLC)
TERAPIA FASE ADIUVANTE E AVANZATA

SCLC
***Pochi casi selezionati T1-T2N0→Malattia operabile**

→ Chirurgia → CT Adiuvante (CDDP+Vp16) x 6 cicli + RT panencefalica

SCLC
(Malattia limitata ad un emitorace)

→ CT (CDDP+ Vp16) x 4 cicli + RT concomitante → RT panencefalica in caso di risposta

NB: Pz con PS 2 o Elderly valutare l'impiego del CBDCA piuttosto che CDDP o dosi attenuate di CDDP ed eventuale RT sequenziale.

SCLC
(Malattia estesa)

→

I°LINEA

CT (CDDP/CBDCA + Vp16) x 4 max 6 cicli,
(RT panencefalica profilattica se buona risposta)
Valutare RT mediastinica in pz selezionati ossia con buon PS, in risposta completa o risposta completa extratoracica e risposta parziale mediastinica dopo 3 cicli di chemioterapia.

II° LINEA

- Nei pz platino sensibili (PD ≥ 6 mesi) è possibile riutilizzare CDDP/CBDCA+Vp16
- Nei pz platino-resistenti-refrattari (PD < 6 mesi) Topotecan ev/os.