

CARCINOMA DELLA MAMMELLA LOCALMENTE AVANZATO INOPERABILE (stadi III B, III C e carcinoma infiammatorio) ALGORITMO

Definizione: la paziente è giudicata non suscettibile di intervento chirurgico, quale primo trattamento, in quanto non operabile in modo radicale (per le dimensioni e/o per la presenza di N2/N3 clinico).

Nella gestione del carcinoma localmente avanzato e del carcinoma infiammatorio è da preferirsi un approccio integrato multidisciplinare di terapia sistemica primaria seguita da chirurgia e radioterapia, ove fattibile.

Descrizione dello stadio:

IIIB → T4a per interessamento della parete toracica, T4b per interessamento della cute, T4c per concomitante interessamento di parete toracica e cute.

IIIC → N3 con qualsiasi T e carcinoma infiammatorio o mastite carcinomatosa (T4d). Il carcinoma infiammatorio rappresenta una entità clinico-patologica caratterizzata da un diffuso indurimento infiammatorio della cute della mammella con bordo erisipeloido, di solito senza una massa palpabile.

I criteri minimi per definire il carcinoma mammario infiammatorio includono i seguenti:

- Esordio rapido a livello mammario di eritema, edema e/o cute a buccia d'arancia, e/o calore, con o senza il riscontro di una massa palpabile;
- Segni clinici di durata inferiore a 6 mesi;
- Eritema esteso ad almeno un terzo della superficie mammaria;
- Evidenziazione dei vasi linfatici;
- Conferma istologica di carcinoma infiltrante.

