

CARCINOMA RENALE IN FASE AVANZATA

I LINEA

II LINEA

III LINEA

**ALTO
RISCHIO**



Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q
42)

Torisel
(25 mg ev/sett)

Cabozantinib*



Opdivo (3 mg/kg 1q14)

Afinitor
(10mg os/die, contin.)

Inlyta (10 mg os/die contin.)

Nexavar
(800mg os/die, contin.)

Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q 42)

Cabozantinib*

Everolimus + Lenvatinib*

**INTERMEDIO
RISCHIO**



Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q 42)

Avastin
(10 mg ev/kg, q 14) +
IFN alfa (9-6-3 MIU/ 3 die/sett)

Votrient
(800 mg os/die, continuativamente)

Cabozantinib*



Opdivo (3 mg/kg 1q14)

Afinitor
(10mg os/die, contin.)

Inlyta (10 mg os/die
contin.)

Nexavar
(800mg os/die, contin.)

Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q
42)

Cabozantinib*

Everolimus + Lenvatinib*

**BASSO-
RISCHIO**



Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q 42)

Votrient
(800 mg os/die,
continuativamente)

Avastin
(10 mg ev/kg, q 14) +
IFN alfa (9-6-3 MIU/ 3 die/sett)



Opdivo (3 mg/kg 1q14)

Afinitor
(10mg os/die, contin.)

Inlyta (10 mg os/die
contin.)

Nexavar
(800mg os/die, contin.)

Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28, q
42)

Cabozantinib*

Everolimus + Lenvatinib*

Opdivo (3 mg/kg 1q14)

Afinitor
(10mg os/die, contin.)

Nexavar
(800mg os/die, contin.)

Sutent
(50 mg os/die, gg. 1-28,
q 42)

Terapia di supporto

* Attualmente non rimborsabile in Italia

Fattori prognostici MSKCC

PS	< 80%
Hb	< limite inf di normalità
LDH	> 1.5 volte il limite superiore di normalità
Ca	> 10 mg/dl
Intervallo libero dalla diagnosi	< 1 anno

Prognosi	N° di fattori	Sopravvivenza media
Favorevole (basso rischio)	0	30 mesi
Intermedia (intermedio rischio)	1-2	14 mesi
Sfavorevole (alto rischio)	3-5	5 mesi

Aggiornamento Settembre 2017