SEMINOMA STADIO CLINICO I

(dopo orchifuniculectomia)

SEMINOMA STADIO IS

(persistenza di valori di α FP LDH e β HCG elevati dopo orchietomia radicale)

RT

SEMINOMA STADIO IIA

(LFN retroperitoneali e/o pelvici < 2 cm)

RT (30 Gy)

SEMINOMA STADIO IIB

(LFN retroperitoneali e/o pelvici 2-5 cm)

SEMINOMA STADIO IIC E III

(LNF retroperitoneali e/o pelvici > 5 cm o M+)

BUONA PROGNOSI

MTS polmonari
 α FP normale
 β HCG e LDH qualunque valore

PEB x 3 cicli o EP x 4 cicli

PROGNOSI INTERMEDIA

MTS viscerali non-polmonari
 α FP normale
 β HCG e LDH qualunque valore

PEB x 4 cicli

TAC torace-addome-pelvi di rivalutazione

No malattia residua (o < 3
cm) e mks nella norma

Follow-up

Malattia residua (> 3 cm)

PD strum. o
elevazione mks

CT II linea

PET (6 settimane dopo fine CT)

Se neg.

Follow-up

Se pos.

RPLND* o CT II linea o RT

*Linfoadenectomia retroperitoneale

NON-SEMINOMA STADIO I

(malattia limitata al testicolo dopo orchiectomia radicale)

NON SEMINOMA STADIO IS

(persistenza di markers elevati dopo orchiectomia radicale)

NON SEMINOMA STADIO IIA E IIB

(malattia retroperitoneale < 2 cm, 2-5 cm dopo orchietomia radicale)

**Stadio IIA e IIB
(Mks pos)**

**3 cicli di PEB
o
4 cicli di VP16-P**

NON SEMINOMA MALATTIA AVANZATA (stadio IIC, IIIA-B-C, IV)