



TRATTAMENTO CON ABRAXANE® (PACLITAXEL ALBUMINA) NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Versione N°3 del 01/04/2015

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Abraxane® - Celgene → Il farmaco è disponibile in fiale da 100 mg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento del tumore metastatico della mammella in pazienti adulti che hanno fallito il trattamento di I linea per la malattia metastatica e per i quali la terapia standard, contenente antraciclina, non è indicata.

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Via</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
Abraxane®	260 mg/m²	ev	die 1	21 giorni

PREMEDICAZIONE

- Aloxi, 1 fl bolo lento ev

SOMMINISTRAZIONE:

Somministrare Abraxane in infusione endovenosa in 30 minuti.

Esaguire ispezione visiva della sacca prima dell'infusione per possibile presenza di filamenti proteinacei. Se sono presenti tali filamenti utilizzare un set di infusione con filtro da 15 micron. Se non disponibile filtro si deve scartare il prodotto.

ESAMI RICHIESTI DURANTE IL TRATTAMENTO

- Emocromo con formula e conta piastrinica
- Esami bioumorali (transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, azotemia, creatininemia, uricemia, glicemia, elettroliti)
- Parametri vitali (frequenza cardiaca e pressione arteriosa)

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO :

TOSSICITA' EMATOLOGICA: Neutropenia, Neutropenia febbrile, Trombocitopenia.

TOSSICITA' NON EMATOLOGICA: Ipersensibilità, Neuropatia, Insufficienza epatica, Cardiotossicità, Nausea, Vomito, Diarrea, Polmonite.

RIDUZIONE DI DOSAGGIO IN CASO DI MIELOTOSSICITA' :



Pazienti con grave neutropenia ($NEU < 0,50 \times 10^9/l$ per una settimana o più) o grave neuropatia sensoriale, riduzione di dose a 220 mg/mq ai cicli successivi.

Se tossicità persistenti, ulteriore riduzione a 180 mg/mq. In caso di mancato recupero, sospendere il trattamento.

BIBLIOGRAFIA

- 1) Gradishar WJ, Tjulandin S, Davidson N, et al. Phase III trial of nanoparticle albumin-bound paclitaxel compared with polyethylate castor oil-based paclitaxel in women with breast cancer. *J Clin Oncol.* 2005;23(31):7794–7803.
- 2) Blum JL, Savin MA, Edelman G, et al. Phase II study of weekly albumin-bound paclitaxel for patients with metastatic breast cancer heavily pretreated with taxanes. *Clin Breast Cancer.* 2007;7(11): 850–856.
- 3) Gradishar WJ, Krasnojon D, Cheporov S, et al. Significantly longer progression-free survival with nab-paclitaxel compared with docetaxel as first-line therapy for metastatic breast cancer. *J Clin Oncol.* 2009;27(22):3611–3619.