TRATTAMENTO CON ABVD NEI LINFOMI DI HODGKIN'S
Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE
Trattamento dei linfomi di Hodgkin's, in prima linea e alla recidiva.

FORMULAZIONE DISPONIBILE
Adriamicina (Adriblalstina) fl da 10,50, 200 mg
Bleomicina (Bleomicina) fl da 15 mg
Vinblastina (Velbe) fl da 10 mg
Dacarbazina (Deticene) fl da 100 mg

SCHEMA POSOLOGICO

Farmaco	*Dose*	*Somministrazione*	*Giorno*	*Riciclo*
ADRIAMICINA	25 mg/m^2	ev	Die 1,15	28 giorni
BLEOMICINA	10 U/m^2	ev	Die 1,15	28 giorni
VINBLASTINA	6 mg/m^2	ev	Die 1,15	28 giorni
DACARBAZINA	375 mg/m^2	ev	Die 1,15	28 giorni

PREMEDICAZIONE
100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametazone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI
Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:
⇒ età $\leq$ 70 anni
⇒ performance status $\leq$ 2 (scala ECOG)
⇒ bilirubina $\leq$ 2 mg/dl
⇒ globuli bianchi $\geq$ 4000/mm^3
⇒ piastrine $\geq$ 100.000/mm^3
⇒ neutrofili $\geq$ 1500/mm^3
⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clareance creatinina$\geq$ 60 ml/min)

ESAMI RICHIESTI DURANTE IL TRATTAMENTO
- Emocromo con formula e conta piastrinica prima di ogni somministrazione.
- Esami bioumorali (transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, azotemia, creatininemia, uricemia, glicemia, elettroliti) ad ogni ciclo.
- Parametri vitali (frequenza cardiaca e pressione arteriosa) nei giorni di trattamento.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, piatrinopenia, alopecia, cardiotossicità (antraciclina), lesioni cutane e iperpigmentazione (Bleomicina), polmonite interstiziale e fibrosi polmonare irreversibile (Bleomicina), neuropatia periferica, reazioni allergiche.

Bibliografia
Bonadonna G. et Al. Combination chemotherapy of Hodgkin's disease with adriamycin, bleomycin, vinblastin and imidazole carboxamide versus MOPP. Cancer 1975, 36: 252.
Bonadonna G. et Al. Combined chemotherapy (MOPP or ABVD) radiotherapy approach in advanced Hodgkin's disease. Cancer Treat. Rep 1977, 61: 769
Carde, P et al. Clinical staging versus laparotomy and combined modality with MOPP versus ABVD in early-stage Hodgkin's disease: The H6 twin randomized trials from the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Cooperative Group. J Clin Oncol 1993; 11:2258