



## TRATTAMENTO CON AID NEI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI

Versione N°1 del 01.01.2014

### INDICAZIONE

Trattamento dei sarcomi dei tessuti molli.

### FORMULAZIONE DISPONIBILE

Adriamicina (Adriblastina) fl da 10,50, 200 mg

Isofosfamide (Holoxan) fl da 1000 mg

Mesna (Uromitexan) fl da 400 mg

### SCHEMA POSOLOGICO

| <i>Farmaco</i> | <i>Dose</i>            | <i>Somministrazione</i> | <i>Giorno</i> | <i>Riciclo</i> |
|----------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| ADRIAMICINA    | 20 mg/m <sup>2</sup>   | ev                      | Die 1,2,3     | 21 giorni      |
| IFOSFAMIDE     | 2500 mg/m <sup>2</sup> | ev                      | Die 1,2,3     | 21 giorni      |

*UROPROTEZIONE CON MESNA 2500 mg/mq per 4 giorni.*

### PREMEDICAZIONE

100 ml di soluzione fisiologica + desametasone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

### PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

- ⇒ età ≤ 70 anni
- ⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)
- ⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl
- ⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm<sup>3</sup>
- ⇒ piastrine ≥ 100.000/mm<sup>3</sup>
- ⇒ neutrofili ≥ 1500/mm<sup>3</sup>
- ⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

### POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, piastrinopenia, alopecia, cardiotossicità da antracicline, stomatite, cistite emorragica.

### Bibliografia

- Elias A et Al. J Clin Oncol 7, 1208-1216, 1989.