



## Carcinoma della Vescica: CMV (Cisplatino, Methotrexate, Vinblastina)

Versione N°0 del 04/07/2011

### INDICAZIONE

Trattamento neoadiuvante delle *neoplasie vescicali muscolo-invasive (pT2 di alto grado, T3, T4a N0/X M0)* per 3 cicli.

### SCHEMA TERAPEUTICO

Farmaco	Dose mg/m <sup>2</sup>	Somministrazione	Giorno				Riciclo
			1	2	8	9	
<i>Methotrexate</i>	30	Bolo e.v	X		X		
<i>Vinblastina</i>	4	Bolo e.v	X		X		Giorno 21°
<i>Platinex</i>	100	e.v		X			
<i>Acido folico</i>	15 mg	e.v. o per os ogni 6 ore per 4 dosi		X		X	

### SOMMINISTRAZIONE

- *Methotrexate*: endovena bolo
- *Vinblastina*: endovena bolo
- *Platinex*: endovena in infusione di 30', diluito in 250 ml di soluzione fisiologica, previa idratazione con 1000 ml di soluzione III + 20 mEq MgSO<sub>4</sub> e seguito da 1500 ml di soluzione III + 20 mEq di KCl
- *Acido Folico*: orale o per via endovenosa ogni 6 ore per 4 dosi dopo 24 h dal methotrexate giorno 2 e giorno 9.

### TERAPIA ANTIEMETICA

- Somministrare farmaci antiemetici (Kytril, Zofran o Navoban) in associazione a 8 mg di Desametasone prima dell'infusione dei chemioterapici, e Palonosetron come premedicazione antiemetica al giorno 2.

### EFFETTI COLLATERALI

- *Ematologici*: leucopenia, trombocitopenia e neutropenia
- *Gastroenterici*: nausea, vomito
- *Renali*: alterazione creatinina, azotemia
- *Neurologici*: parestesie, ileo

### ESAMI CONSIGLIATI PRIMA DEL RICICLO DELLA TERAPIA

- *Emocromo* (con formula leucocitaria e conta piastrinica)
- *Funzionalità renale* (azotemia, creatininemia, creatinina clearance)

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- International collaboration of trialist of the medical research council advanced bladder cancer working party, "International phase III trial assessing neoadjuvant cisplatin, methotrexate, and vinblastine chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer: long-term results of the BA0630894 Trial" J Clin Oncol 29:2171-2177, 2011

Data, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Medico: \_\_\_\_\_