



CISPLATINO + VINBLASTINA + TEMOZOLOMIDE (CVT) NEL MELANOMA METASTATICO

Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento di prima linea nel melanoma metastatico

FORMULAZIONE DISPONIBILE

CISPLATINO (Platinex®, Platamine®)

→ fl da 10 mg e 25 mg

VINBLASTINA (Velbe®)

→ fl da 10 mg

TEMOZOLOMIDE (Temodal®)

→ cps da 5, 20, 100 e 250 mg

SCHEMA POSOLOGICO

FARMACO	DOSE (mg/m ²)	SOMMINISTRAZIONE	GIORNO	RICICLO
CISPLATINO	20	e.v.	1 → 4	21
VINBLASTINA	1,2	e.v.	1	21
TEMOZOLOMIDE	150	e.v.	1 → 4	21

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

CISPLATINO (Platinex®, Platamine®) viene diluito in soluzione fisiologica da 500 cc in infusione ev di 60',
preceduto da: soluzione fisiologica 500 cc + KC1 20 mEq + Decadron 8 mg
seguito da: soluzione fisiologica 1500 cc + Ranidil 1 fl.

VINBLASTINA (Velbe®) in bolo ev

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati alla terapia, pazienti con le seguenti caratteristiche:

- Performance Status ≤ 2 (ECOG)
- Neutrofili $\geq 1500/\text{mm}^3$
- Piastrine $\geq 100.000/\text{mm}^3$
- AST e ALT $\leq 1.5 \times \text{UNL}$; bilirubina totale $\leq 1.5 \text{ mg/dl}$
- Creatinina $\leq 1.5 \text{ mg/dl}$ e creatinina clearance $\geq 75 \text{ ml/min}$

CRITERI DI RIDUZIONE

Se tossicità renale di grado 2, ridurre la dose di cisplatino del 25% e aumentare l'idratazione.

Se tossicità ematologica di grado 3 e 4, ridurre la dose dei chemioterapici del 25%

Se tossicità neurologica di grado 2, stop cisplatino

EFFETTI COLLATERALI

Tossicità ematologica: Anemia, Neutropenia, Trombocitopenia.

Tossicità non ematologica: Astenia, Nausea e vomito, Alterazione della funzionalità renale, Alterazione della funzionalità epatica.

BIBLIOGRAFIA

-Atkins MB et al., Clinical Cancer Res. Vol. 8, 3075-3081, Oct.2002