



TRATTAMENTO CON CYVADIC NEI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI

Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento dei sarcomi dei tessuti molli.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Ciclofosfamide (Endoxan) fl da 500 e 1000 mg

Adriamicina (Adriblastina) fl da 10,50, 200 mg

Vincristina (Vincristina) fl da 1 e 2 mg

Dacarbazina (Deticene) fl da 100 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
CICLOFOSFAMIDE	500 mg/m ²	ev	Die 1	21 giorni
ADRIAMICINA	50 mg/m ²	ev	Die 1	21 giorni
VINCRISTINA	1 mg/m ²	ev	Die 1-5	21 giorni
DACARBAZINA	250 mg/mq	ev	Die 1,2,3,4,5	21 giorni

PREMEDICAZIONE

100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametasone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

⇒ età ≤ 70 anni

⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)

⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl

⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm³

⇒ piastrine ≥ 100.000/mm³

⇒ neutrofili ≥ 1500/mm³

⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, piastrinopenia, alopecia, cardiotossicità da antracicline, stomatite, cistite emorragica, stipsi.

Bibliografia

- Wilbur JR et Al. Cancer 36, 765-769, 1975.