



**CARCINOMA DELL'ANO: TRATTAMENTO CON CISPLATINO e FLUOROURACILE C + RT**

Versione N°2 del 01/02/2016

**INDICAZIONE**

Trattamento indicato nel carcinoma spinocellulare localmente avanzato dell'ano

**SCHEMA TERAPEUTICO**

<i>Farmaci</i>	<i>Dose mg/m<sup>2</sup></i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorni di terapia</i>
<b>PLATINEX</b>	20	Infusione di 2h	1 → 5
<b>FLUOROURACILE</b>	750	Infusione di 22h	1 → 5

<b>RADIOTERAPIA</b>	Pelvi-perineale 5600 cGy in 6 settimane
---------------------	---

*Il trattamento chemioterapico viene somministrato la 1° e la 4° settimana di radioterapia.*

**PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE**

**PLATINEX**

- Va diluito in 250 cc di soluzione fisiologica; la somministrazione deve essere preceduta da 500 cc di Normosol R/K e seguita da 500 cc di soluzione glucosata 5% con 15 mEq di MgSO<sub>4</sub>.  
*Non deve essere superata la velocità di infusione di 500 cc/ora.*

**FLUOROURACILE**

- Va somministrato in infusione continua di 22 h, subito dopo l'infusione di platino

Sono candidati a tale trattamento pazienti con le seguenti caratteristiche:

- Età ≤75 anni
- Performance status ≤2 (scala ECOG)
- Creatinina <1.2 mg/ml
- Bilirubina <3 mg/ml
- GB ≥3000 mm<sup>3</sup>

Data, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Medico: \_\_\_\_\_

Faivre C, Rougier P, Ducreux M, et al. 5-fluorouracil and cisplatin combination chemotherapy for metastatic squamous-cell anal cancer. Bull Cancer 1999;86:861-5.