



CARCINOMA PROSTATICO: TRATTAMENTO CON ELIGARD® (leuprorelina acetato)

Versione N°1 del 22/05/2018

INDICAZIONE:

- Carcinoma prostatico avanzato (recidiva biochimica o malattia metastatica), ormono-dipendente.
- Carcinoma prostatico localizzato e localmente avanzato, ad alto rischio e ormono-dipendente, in combinazione con la radioterapia.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Eligard® - Astellas Pharma → fiale da 7,5, 22,5 e 45 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorni</i>
Eligard®	7.5 mg	s.c.	Ogni 28 giorni
Eligard®	22.5 mg	s.c.	Ogni 3 mesi
Eligard®	45 mg	s.c.	Ogni 6 mesi

SOMMINISTRAZIONE

La dose di Eligard deve essere somministrata s.c. in singola iniezione dopo aver miscelato il contenuto delle due siringhe pre-riempite che compongono la confezione. La miscelazione del farmaco deve avvenire immediatamente prima della somministrazione.

La somministrazione aggiuntiva di un antiandrogeno appropriato deve essere considerata iniziando 3 giorni prima della terapia con la leuprorelina e continuando per le prime due o tre settimane di trattamento. E' stato segnalato che tale procedura previene le conseguenze di un iniziale aumento del testosterone sierico

ESAMI RICHIESTI

- Emocromo, glicemia, prove di funzionalità epatica e renale, trigliceridi
- Monitoraggio osteoporosi attraverso MOC

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO

Vampate, calo della libido, impotenza, ginecomastia, aumento di peso, insonnia, capogiri, cefalea, nausea, diarrea, sudorazione notturna, eruzioni cutanee, mialgia, atrofia testicolare, astenia, sindrome simil-influenzale, depauperamento del tenore calcico, ipoglicemia.

BIBLIOGRAFIA

Perez-Marreno R, Chu FM, Gleason D, Loizides E, Wachs B, Tyler RC. Clin Ther. 2002 Nov;24(11):1902-14.

A six-month, open-label study assessing a new formulation of leuprolide 7.5 mg for suppression of testosterone in patients with prostate cancer.

Chu F, Jayson M, Dineen M, Perez R, Harkaway R, Tyler R. A clinical study of 22.5 mg LA-2550: A new subcutaneous depot delivery system for leuprolide acetate for the treatment of prostate cancer. Journal of Urology 2002;168:1199-1203.