

CARCINOMA GASTRICO E DELLA GIUNZIONE GASTRO-ESOFAGEA LOCALMENTE AVANZATO : TRATTAMENTO CON FLUOROURACILE + ACIDO FOLINICO + DOCETAXEL + OXALIPLATINO (FLOT)

Versione N°0 del 01.08.2017
(Dr. L. Dottorini)

INDICAZIONE

Trattamento peri-operatorio del tumore gastrico e della giunzione gastro-esofagea localmente avanzato (cT \geq 2 e/o cN+) . Nel setting peri-operatorio sono previsti 4 cicli pre- e 4 cicli post-chirurgia.

FORMULAZIONE

Oxaliplatino (ELOXATIN[®]) fl da 50 mg e 100mg
Acido folinico (LEDERFOLIN[®]) fl da 25, 100, 175 mg
5-fluorouracile (FLUOROURACILE) fl da 250, 500, 1000, 5000 mg
Docetaxel (Taxotere[®]) fl da 20 mg, 80 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose (mg/m²)</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
Oxaliplatino	85	ev in 3 ore	1	14 giorni
Docetaxel	50	ev in 1 ora	1	14 giorni
Acido folinico	200	ev in 2 ore	1	14 giorni
FLUOROURACILE	2600	ev in infusione di 24 ore	1	14 giorni

PREPARAZIONE

OXALIPLATINO : Va diluito in 500 cc di soluzione glucosata 5% ed infuso in 3 ore
DOCETAXEL : Va diluito in 500 cc di soluzione fisiologica ed infuso in 1 ora
LEDERFOLIN : Va diluito in 500 cc di soluzione fisiologica ed infuso in 2 ore
FLUOROURACILE : Va diluito in 500 cc di soluzione fisiologica ed infuso in 24 ore

ESAMI RICHIESTI DURANTE IL TRATTAMENTO

- Emocromo con formula leucocitaria e piastrine prima di ogni somministrazione.
- Biochimica epatica e renale completa ad ogni somministrazione

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO

Neurotossicità periferica, neutropenia, piastrinopenia, nausea, vomito, diarrea, mucosite.

BIBLIOGRAFIA

S-E Al-Batran et al. *Perioperative chemotherapy with docetaxel, oxaliplatin, and fluorouracil/leucovorin (FLOT) versus epirubicin, cisplatin, and fluorouracil or capecitabine (ECF/ECX) for resectable gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma (FLOT4-AIO): A multicenter, randomized phase 3 trial; J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 4004).*