



Carcinoma del pancreas operato : Gemcitabina + Capecitabina

Versione N°0 del 01.05.2017

INDICAZIONE

Neoplasia del pancreas radicalmente operato : trattamento adiuvante

SCHEMA POSOLOGICO

GEMCITABINA (**Gemzar®**)

→ fl da 200 mg, 1 g

Xeloda (Capecitabina®)

→ cp da 500 mg, 125 mg

POSOLOGIA

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
GEMCITABINA	1000 mg/m ²	ev	die 1, 8, 15	28 giorni
Capecitabina	1660 mg/m ² /die	os	die 1 →21	28 giorni

SOMMINISTRAZIONE : Il trattamento adiuvante deve essere somministrato per sei cicli totali

ESAMI RICHIESTI DURANTE IL TRATTAMENTO

- Emocromo con formula e conta piastrinica ed esami bioumorali (transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, azotemia, creatinemia, uricemia, glicemia, elettroliti) compreso calcolo della clearance della creatinina prima di ogni ciclo.
- Parametri vitali (frequenza cardiaca e pressione arteriosa) prima di ogni ciclo di trattamento.

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO

TOSSICITA' EMATOLOGICA : Anemia, Leucopenia, Neutropenia, Trombocitopenia,

TOSSICITA' NON EMATOLOGICA : Nausea, Vomito, Diarrea, Mucosite, Fatigue, Cardiaca, Polmonare, Epatica

BIBLIOGRAFIA

- J. Neoptolemos et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial The Lancet 6736: 32409-32426, 2017