

TRATTAMENTO CON JURNISTA (Idromorfone Cloridrato)

Versione N°0 del 12/11/2014

INDICAZIONE: JURNISTA è indicato per il trattamento del dolore intenso.

FORMULAZIONE: Compresse a rilascio prolungato da 4, 8, 16, 32, 64 mg.

SCHEMA POSOLOGICO

| <i>Farmaco</i> | <i>Dose (mg)</i> | <i>Somministrazione</i> |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Jurnista | 1 cp die | os |

SOMMINISTRAZIONE:

Il farmaco va assunto UNA volta al giorno e deglutito intero con un bicchiere d'acqua.

INIZIO TERAPIA:

Pazienti mai trattati con oppioidi:

Trattamento con 8 mg/die nella maggior parte dei pazienti, in alcuni casi è possibile iniziare da 4 mg. Dopo 3 giorni, se richiesto, la dose deve essere aggiustata in aumento con variazioni di 4 o 8 mg a seconda della risposta e della richiesta di analgesici supplementari.

Pazienti già in trattamento con oppioidi:

La dose deve tenere conto del dosaggio dell'oppioide già in corso. Vedi tabella di conversione.

Tabella di conversione: fattori di moltiplicazione per la conversione della dose giornaliera di oppiacei somministrati in precedenza, nella dose giornaliera di JURNISTA(mg/die di oppiacei precedenti x fattore = mg/die di JURNISTA)

| Oppiacei precedenti | Oppiacei precedenti per via orale (fattore) | Oppiacei precedenti per via parenterale (fattore) |
|---------------------|---|---|
| Morfina | 0,2 | 0,6 |
| Idromorfone | 1 | 4 |

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO:

Vertigini, sonnolenza, cefalea, stipsi, nausea, vomito, astenia, calo ponderale, tachicardia, disturbi del tono dell'umore, tremori, offuscamento della vista, dispnea, iperidrosi, vampate di calore, secchezza delle mucose, ipotensione e ipertensione, dipendenza.

BIBLIOGRAFIA:

Gardner-Nix J, Mercadante S. The role of OROS hydromorphone in the management of cancer pain. Pain Pract. 2010 Jan-Feb;10(1):72-7.