



**TRATTAMENTO CON LEUKERAN NEI LINFOMI NON HODGKIN'S**  
Versione N°0 del 01.01.2011

**INDICAZIONE**

Trattamento dei linfomi non Hodgkin's a basso grado di malignità o in pazienti anziani con PS scaduto.

**FORMULAZIONE DISPONIBILE**

**Clorambucil (Leukeran)** cp da 2 mg.

**SCHEMA POSOLOGICO**

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Riciclo</i>
CLORAMBUCIL	10 mg/die	os	Continuativamente

*Il farmaco può essere somministrato anche al dosaggio di 16 mg/mq die 1→5 ogni 28 giorni*

**PAZIENTI CANDIDATI**

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

- ⇒ performance status  $\leq 2$  (scala ECOG)
- ⇒ bilirubina  $\leq 2$  mg/dl
- ⇒ globuli bianchi  $\geq 4000/\text{mm}^3$
- ⇒ piastrine  $\geq 100.000/\text{mm}^3$
- ⇒ neutrofili  $\geq 1500/\text{mm}^3$
- ⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia  $< 1.5$  mg/dl, clearance creatinina  $\geq 60$  ml/min)

**POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI**

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, piastrinopenia, dermatite, tossicità epatica

*Bibliografia*

Martinelli G. et Al. Chlorambucil in combination with induction and maintenance rituximab is feasible and active in indolent non Hodgkin's lymphoma. Br J Haematol 2003, 123: 271.