



TRATTAMENTO CON MOPP NEI LINFOMI DI HODGKIN'S

Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento dei linfomi di Hodgkin's.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Mecloretamina (Caryolisin)

Vincristina (Vincristina) fl da 1 e 2 mg

Procarbazina (Natulan) cp 50 mg

Prednisone (Deltacortene) cp da 5 e 25 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
MECLORETAMINA	6 mg/m ²	ev	Die 1,8	28 giorni
VINCRISTINA	1,4 mg/m ²	ev	Die 1,8	28 giorni
PROCARBAZINA	100 mg/m ²	po	Die 1-14	28 giorni
PREDNISONE	40 mg/m ²	po	Die 1-14	28 giorni

PREMEDICAZIONE

100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametasone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

⇒ età ≤ 70 anni

⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)

⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl

⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm³

⇒ piastrine ≥ 100.000/mm³

⇒ neutrofili ≥ 1500/mm³

⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, alopecia, neuropatia periferica, piastrinopenia, parestesie, ipotensione, reazioni allergiche, stipsi.

Bibliografia

Canellos GP et al. Chemotherapy of advanced Hodgkin's disease with MOPP, ABVD, or MOPP alternating with ABVD. N Eng J Med 1992; 327:1478

De Vita VT et Al. Combination chemotherapy in the treatment of advanced Hodgkin's disease. Ann Int Med 1970, 73: 881.