

## TRATTAMENTO CON PALEXIA (Tapentadolo)

Versione N°1 del 01/06/2015

**INDICAZIONE:** PALEXIA è indicato per il trattamento, negli adulti, del dolore cronico severo che può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici oppioidi.

**FORMULAZIONE:** Compresse da 50, 100, 150, 200, 250 mg

### SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose (mg)</i>	<i>Somministrazione</i>
Palexia	1 cp x 2 die	os

### SOMMINISTRAZIONE:

Il farmaco va assunto due volte al giorno a stomaco pieno o vuoto senza rompere la capsula.

### INIZIO TERAPIA:

#### **Pazienti mai trattati con oppioidi:**

Trattamento con singole dosi da 50 mg di tapentadolo compressa a rilascio prolungato somministrate due volte al dì. Incrementi di 50 mg alla volta ogni 3 giorni.

#### **Pazienti già in trattamento con oppioidi:**

La dose deve tenere conto del dosaggio dell'oppioide già in corso. Vedi tabella di conversione allegata.

**Dose massima consentita 500 mg die.**

### EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO:

Vertigini, sonnolenza, cefalea, stipsi, disturbi del tono dell'umore, tremori, iperidrosi, vampate di calore, secchezza delle mucose, inappetenza, spasmo dello sfintere di Oddi, depressione respiratoria, dipendenza.

### BIBLIOGRAFIA:

Tapentadol immediate release: a new treatment option for acute pain management.

Afilalo M et Al. J Pain Res. 2010 Feb 8;3:1-9.

FARMACO	DOSAGGIO														
Codeina os mg/die		120		240											
tramadolo os mg/die		150		300		400		-	-	-	-	-	-	-	
tramadolo sc, ev mg/die		100		200		300		400	-	-	-	-	-	-	
<b>morfina os mg/die</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	
morfina sc ev mg/die	7-10	10-15	15-20	20-30	30-40	30-45		40-60	50-75	60-80	60-90	65-100	70-105	80-120	
ossicodone os mg/die	10		20	30	40			60		80	90	100		120	
idromorfone os mg/die	4		8	12	16			24		32		40		48	
tapentadolo os mg/die	50		100	150	200		250								
fentanyl TD µg/h		12		25		37		50	62		75		87	100	
buprenorfina TD µg/h		17.5		35		52.5		70	87.5		105		122.5	140	
		per morfina > 300 mg conversione 1:12						per morfina da 90 a 300 mg conversione 1:8			per morfina < 90 mg conversione 1:4				
morfina per os mg/die		1200						240			80				
metadone per os mg/die		100						30			20				