



## TRATTAMENTO CON PEB nei TUMORI del TESTICOLO

Versione N°0 del 01.01.2011

### INDICAZIONE

Trattamento dei tumori del testicolo come terapia di salvataggio.

### FORMULAZIONE DISPONIBILE

Bleomicina (Bleomicina) fl da 15 mg

Etoposide (Vepesid) fl da 100, 200, 1000 mg.

Cisplatino (Platamine, Platinex) fl da 10, 25, 50.

### SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
CISPLATINO	20 mg/mq	e.v	Die 1,2,3,4,5	21 giorni
BLEOMICINA	18U/mq	e.v/ i.m.	Die 2,9,16	21 giorni
ETOPOSIDE	100 mg/mq	e.v	Die 1,2,3,4,5	21 giorni

Dose max di bleomicina 30U

### PREMEDICAZIONE

100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametasone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

### PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

⇒ età  $\leq$  70 anni

⇒ performance status  $\leq$  2 (scala ECOG)

⇒ bilirubina  $\leq$  2 mg/dl

⇒ globuli bianchi  $\geq$  4000/mm<sup>3</sup>

⇒ piastrine  $\geq$  100.000/mm<sup>3</sup>

⇒ neutrofili  $\geq$  1500/mm<sup>3</sup>

⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia  $<$  1.5 mg/dl, clearance creatinina  $\geq$  60 ml/min)

### POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, alopecia, lesioni cutanee e iperpigmentazione (Bleomicina), polmonite interstiziale e fibrosi polmonare irreversibile (Bleomicina), neuropatia periferica, nefrotossicità, stipsi, reazioni allergiche, febbre.

### Bibliografia

Williams S.D. et Al. J Clin Oncol 12, 701-706, 1994..