TRATTAMENTO CON PEC dell'ADENOCARCINOMA dell'ENDOMETRIO
Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE
Trattamento dell'adenocarcinoma dell'endometrio.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Paclitaxel (Taxol) fl da 100 mg
Epirubicina (Farmorubicina) fl da 10, 50, 200 mg
Cisplatino (Platamine, Platinex) fl da 10, 25, 50 mg.

SCHEMA POSOLOGICO

Farmaco	*Dose*	*Somministrazione*	*Giorno*	*Riciclo*
CISPLATINO	50 mg/mq	e.v	Die 1	21 giorni
PACLITAXEL	175U/mq	e.v	Die 1	21 giorni
EPIRUBICINA	70 mg/mq	e.v	Die 1	21 giorni

PREMEDICAZIONE
100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametazone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI
Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:
⇒ età $\leq$ 70 anni
⇒ performance status $\leq$ 2 (scala ECOG)
⇒ bilirubina $\leq$ 2 mg/dl
⇒ globuli bianchi $\geq$ 4000/mm^3
⇒ piastrine $\geq$ 100.000/mm^3
⇒ neutrofili $\geq$ 1500/mm^3
⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clareance creatinina$\geq$ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Nausea, vomito, stomatite, leucopenia, neutropenia, alopecia, neuropatia periferica, nefrotossicità, cardiotossicità, reazioni allergiche.

Bibliografia

Lissoni A et Al. Proc Am Soc Clin Oncol 16,373°,1997.