



TRATTAMENTO CON PEI nei TUMORI del TESTICOLO
Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento dei tumori del testicolo come terapia di salvataggio.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Ifosfamide (Holoxan) fl da 1000 mg.

Etoposide (Vepesid) fl da 100, 200, 1000 mg.

Cisplatino (Platamine, Platinex) fl da 10, 25, 50.

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
CISPLATINO	40 mg/mq	e.v	Die 3,4,5	21 giorni
IFOSFAMIDE	2 g/mq	e.v	Die 1,2	21 giorni
ETOPOSIDE	100 mg/mq	e.v	Die 3,4,5	21 giorni

PREMEDICAZIONE

Abbondante idratazione

Mesna (uroprotettore): 600 mg/mq ogni 4 ore x 4 dosi die 1 e 2.

100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametasone 20 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

⇒ età ≤ 70 anni

⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)

⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl

⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm³

⇒ piastrine ≥ 100.000/mm³

⇒ neutrofilii ≥ 1500/mm³

⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, alopecia, neuropatia periferica, nefrotossicità, reazioni allergiche, encefalopatia, cistite anche emorragica.

Bibliografia

Lochrer. et Al. Proc Am Soc Clin Oncol 4, 100, 1994.

Einhorn L. et Al. J Clin Oncol 8, 177, 1990.