TERAPIA ANTIEMETICA IN CORSO DI CHEMIOTERAPIA : TRATTAMENTO CON SANCUSO

Versione N°1 del 30.1.2019
(Dr I. Sarno)

INDICAZIONI

SANCUSO cerotto transdermico è indicato negli adulti per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia moderatamente o altamente emetogena, per una durata prevista di 3-5 giorni consecutivi, dove la somministrazione di antiemetici per via orale sia complicata da fattori che rendono difficoltosa la deglutizione

FORMULAZIONE

Cerotto trans dermico 3,1 mg/24 ore. (ProStrakan)

MECCANISMO D'AZIONE

Antagonista altamente selettivo della 5-idrossitriptamina (recettori 5HT3).

SCHEMA POSOLOGICO E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE:

Applicare un singolo cerotto transdermico da 24 a 48 ore prima della chemioterapia, come opportuno. Il cerotto transdermico deve essere rimosso dopo un minimo di 24 ore dal completamento della chemioterapia. Il cerotto transdermico può essere indossato per un periodo fino a 7 giorni, a seconda della durata del regime chemioterapico.
Il cerotto transdermico non deve essere applicato su cute arrossata, irritata o lesa.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità al principio attivo o ad altri antagonisti dei 5-HT3.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI D'IMPIEGO:

Patologie cardiache (aritmie o anomalie ECG);
Esposizione solare;
Patologie gastrointestinale (riduzione motilità intestinale);
Doccia e lavaggio.

EFFETTI COLLATERALI:

Stipsi, cefalea, vertigini, vampate, secchezza della bocca, nausea, rialzo indici epatici, irritazione nella sede di applicazione.

BIBLIOGRAFIA

- Boccia RV, Gordan LN, Clark G, et al. Efficacy and tolerability of transdermal granisetron for the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with moderately and highly emetogenic multi-day chemotherapy: a randomized, double-blind, phase III study. Support Care Cancer.19:1609-1617, 2011.