

## TRATTAMENTO CON TARGIN (Ossicodone Cloridrato + Naloxone Cloridrato)

Versione N°1 del 01/06/2015

**INDICAZIONE:** TARGIN è indicato per il trattamento del dolore severo che può essere adeguatamente gestito solo con oppioidi analgesici.

### FORMULAZIONE:

Targin- MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL: Compresse a rilascio prolungato da 5mg/2,5mg – 10mg/5mg – 20mg/10mg- 40mg/20mg.

**SCHEMA POSOLOGICO** (prescrivibile su ricettario regionale)

<i>Farmaco</i>	<i>Dose (mg)</i>	<i>Somministrazione</i>
Targin	1 cp x 2 die	os

### SOMMINISTRAZIONE:

Le compresse a rilascio prolungato possono essere assunte con sufficiente liquido con o senza cibo. Le compresse di Targin devono essere deglutite intere e non rotte o masticate.

*L'antagonista oppioide naloxone è aggiunto per contrastare la stipsi indotta dall'oppioide, bloccando l'azione dell'ossicodone a livello dei recettori oppioidi del tratto gastrointestinale.*

### INIZIO TERAPIA:

**Pazienti mai trattati con oppioidi:**

La dose iniziale è di 10 mg/5 mg di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato, ad intervalli di 12 ore.

**Pazienti già in trattamento con oppioidi:**

I pazienti che sono già in trattamento con oppioidi possono iniziare con dosi più alte di Targin in base alla precedente esperienza. Vedi tabella di conversione.

***La dose massima giornaliera di Targin è 80 mg di ossicodone cloridrato e 40 mg di naloxone cloridrato.***

### EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO:

Inappetenza, irrequietezza, capogiri, cefalea, vertigini, ipotensione, dolore addominale, stipsi, diarrea, secchezza delle fauci, dispepsia, vomito, nausea, flatulenza, aumento degli enzimi epatici, iperidrosi, prurito, brividi, astenia, dipendenza, singhiozzo, alterazioni dell'umore.

### BIBLIOGRAFIA:

Long-term safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate-to-severe chronic cancer pain. Ahmedzai SH et Al. Support Care Cancer. 2014 Sep 14.

FARMACO	DOSAGGIO														
Codeina os mg/die		120		240											
tramadolo os mg/die		150		300		400		-	-	-	-	-	-	-	
tramadolo sc, ev mg/die		100		200		300		400	-	-	-	-	-	-	
<b>morfina os mg/die</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	
morfina sc ev mg/die	7-10	10-15	15-20	20-30	30-40	30-45		40-60	50-75	60-80	60-90	65-100	70-105	80-120	
ossicodone os mg/die	10		20	30	40			60		80	90	100		120	
idromorfone os mg/die	4		8	12	16			24		32		40		48	
tapentadolo os mg/die	50		100	150	200		250								
fentanyl TD µg/h		12		25		37		50	62		75		87	100	
buprenorfina TD µg/h		17.5		35		52.5		70	87.5		105		122.5	140	
		per morfina > 300 mg conversione 1:12						per morfina da 90 a 300 mg conversione 1:8				per morfina < 90 mg conversione 1:4			
morfina per os mg/die		1200						240				80			
metadone per os mg/die		100						30				20			