



Carcinoma mammario: TRATTAMENTO CON PACLITAXEL (TAXOL®)

Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento nel carcinoma mammario avanzato.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Paclitaxel (TAXOL®) → fiale da 30 e da 100 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Riciclo</i>
Paclitaxel (TAXOL®)	175 mg/m ²	ev	Ogni 21 giorni

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

TAXOLO: somministrato in infusione di 3 in 1000 cc di soluzione glucosata al 5%
preceduto, 30 minuti prima, da: Trimeton 1fl im+ Solucortef 250 mg ev bolo+ Tagamet 300 mg ev bolo; Soluzione fisiologica 100 cc + Zofran 1fl
Ulteriore idratazione, più o meno antiemetici, al termine del trattamento a discrezione del medico

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati alla terapia pazienti con le seguenti caratteristiche:

Età ≤ 75 anni

PS ≤ 2 (Scala ECOG)

Neutrofili ≥ 1500/mm³

Piastrine ≥ 150.000/mm³

AST < 1.5 x valori normali

Creatinina < 1.5 x valori normali

Glicemia < 200 mg/dl

CRITERI DI RIDUZIONE

Ciascuna somministrazione va ripetuta previa rivalutazione emocromocitometrica; in caso di mancato recupero midollare si applicheranno le seguenti riduzioni di dose:

<i>Neutrofili</i>	<i>Piastrine</i>	
1.500-1.000	100.000 – 75.000	75%
< 1.000	< 75.000	Sospensione temporanea

BIBLIOGRAFIA

Jones SE et Al. J Clin Oncol 23 (24): 5542-5551, 2005