



TRATTAMENTO CON VBM nei TUMORI del TESTA-COLLO
Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento dei tumori del testa-collo.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Bleomicina (Bleomicina) fl da 15 mg

Vincristina (Vincristina) fl da 1 e 2 mg

Methotrexate (Metotrexato/Metotressato) fl da 50, 500, 1000, 5000 mg.

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
VINCRISTINA	1 mg/mq	e.v	Die 1	7 giorni
BLEOMICINA	15U	i.m.	Dopo 6 e 24 h dalla vincristina	7 giorni
METHOTREXATE	20 mg/mq	o.s.	Dopo 48 h dalla vincristina	7 giorni

PREMEDICAZIONE

100 ml di soluzione fisiologica + antagonista della serotonina (es. Zofran, Navoban) + desametasone 8 mg, in infusione ev in 15 minuti.

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

⇒ età ≤ 70 anni

⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)

⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl

⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm³

⇒ piastrine ≥ 100.000/mm³

⇒ neutrofili ≥ 1500/mm³

⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, leucopenia, neutropenia, alopecia, lesioni cutanee e iperpigmentazione (Bleomicina), polmonite interstiziale e fibrosi polmonare irreversibile (Bleomicina), neuropatia periferica, reazioni allergiche, cistite emorragica, stipsi.

Bibliografia

Molinari R. et Al Eur J Cancer 16, 469-472, 1980.