



CARCINOMA COLORETTALE: TRATTAMENTO CON VECTIBIX® (Panitumumab)

Versione N°3 del 01.04.2017

INDICAZIONE

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma coloretale metastatico RAS WT:

- in prima linea in associazione con FOLFOX o FOLFIRI
- in seconda linea in associazione con FOLFIRI in pazienti che hanno ricevuto in prima linea chemioterapia a base di fluoropirimidine (escludendo irinotecan)
- monoterapia dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecano.

FORMULAZIONE DISPONIBILE

PANITUMUMAB (Vectibix®) flaconi da 400mg in 20ml di soluzione infusionale e flaconi da 100mg in 5ml di soluzione infusionale.

SCHEMA POSOLOGICO

FARMACO	SOMMINISTRAZIONE	POSOLOGIA	GIORNO
Vectibix®	Ev in 60 min	6mg/kg	Die 1 ogni 14giorni

NB: Vectibix deve essere somministrato tramite il filtro in linea di 0.2 o 0.22 micrometri a basso legame proteico.

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO

Rash acneiforme, prurito, xerodermia, mucosite, paronichia, ipomagnesiemia

CRITERI DI COMPORTAMENTO PER EFFETTI COLLATERALI

RASH CUTANEO G1- G2: proseguire il trattamento

G3: sospendere il trattamento fino a recupero (\leq G2) per un massimo di 2 settimane poi riprendere

G4 o persistenza G3 dopo 2 settimane di sospensione: interrompere il trattamento

SCALA VALUTAZIONE RASH CUTANEO NCI CTC

GRADO			
1	2	3	4
Eruzione maculo-papulare o eritema non associato a sintomi	Eruzione maculo-papulare con prurito interessante < 50% sup corporea	Eritrodermia generalizzata o eruzione maculo-papulo-vescicolare interessante \geq 50% sup corporea	Dermatite esfoliativa generalizzata o dermatite ulcerativa sup corporea

NB: Il Medico, al primo trattamento con il farmaco in oggetto, è invitato a leggere la scheda tecnica originale, depositata in segreteria.

BIBLIOGRAFIA

-Douillard JY et al, *Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: the PRIME study.* J Clin Oncol. 2010 Nov 1;28(31):4697-705

- Mitchell EP et al, *The efficacy and safety of panitumumab administered concomitantly with FOLFIRI or Irinotecan in second-line therapy for metastatic colorectal cancer: the secondary analysis from STEPP (Skin Toxicity Evaluation Protocol With Panitumumab) by KRAS status.* Clin Colorectal Cancer. 2011 Dec;10(4):333-9

- Van Cutsem E et al, *An open-label, single-arm study assessing safety and efficacy of panitumumab in patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard chemotherapy.* Ann Oncol. 2008 Jan;19(1):92-8.