



TRATTAMENTO CON VELCADE NEL MIELOMA MULTIPLO
Versione N°0 del 01.01.2011

INDICAZIONE

Trattamento del mieloma multiplo

FORMULAZIONE DISPONIBILE

Bortezomib (Velcade) fl da 1,5 mg

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
BORTEZOMIB (Velcade)	1,3 mg/m ²	ev	Die 1,4,8,11	21 giorni

PAZIENTI CANDIDATI

Sono candidati i pazienti con le seguenti caratteristiche:

- ⇒ età ≤ 70 anni
- ⇒ performance status ≤ 2 (scala ECOG)
- ⇒ bilirubina ≤ 2 mg/dl
- ⇒ globuli bianchi ≥ 4000/mm³
- ⇒ piastrine ≥ 100.000/mm³
- ⇒ neutrofili ≥ 1500/mm³
- ⇒ adeguata funzionalità renale (creatininemia < 1.5 mg/dl, clearance creatinina ≥ 60 ml/min)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, diarrea, pancitopenia, neuropatia periferica, convulsioni, ipotensione, insufficienza cardiaca.

Bibliografia

Richardson, PG et al. Bortezomib or high-dose dexamethasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med 2005; 352:2487