



## Tumori neuroendocrini: TRATTAMENTO CAPECITABINA + OXALIPLATINO (XELOX)

Versione N°1 del 01/09/2015

### INDICAZIONI

Tumori neuroendocrini

### SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose mg/m<sup>2</sup></i>	<i>Somministrazione</i>	<i>giorni</i>
Oxaliplatino (Eloxatin <sup>®</sup> )	130	e.v.	1
Capecitabina (Xeloda <sup>®</sup> )	2000	os	2 - 15

*I cicli di terapia sono ripetuti ogni 21 giorni*

### FORMULAZIONI DISPONIBILI

- **CAPECITABINA** *compresse da 150 e 500 mg*  
Le compresse vanno assunte in 2 somministrazioni giornaliere, ogni 12 ore, a stomaco pieno
- **OXALIPLATINO** *fiale da 50 e 100 mg*

### EFFETTI COLLATERALI

Nausea, vomito, diarrea, parestesie, neutropenia, sindrome mano-piede, reazioni allergiche.

### CRITERI DI RIDUZIONE

*Evento avverso di grado 3:* proseguire, alla risoluzione dell'evento, o al 75% della dose totale

*Evento avverso di grado 4:* interruzione del trattamento ed eventuale prosecuzione, alla risoluzione dell'evento, al 50% della dose totale

### BIBLIOGRAFIA

Bajetta E, Catena L, Procopio G, Are capecitabine and oxaliplatin (XELOX) suitable treatments for progressing low-grade and high-grade neuroendocrine tumours? Cancer Chemother Pharmacol. 2007 Apr;59(5):637-42. Epub 2006 Aug 26.

Data \_\_\_\_\_

Medico \_\_\_\_\_